

FibroTest/FibroMax

Nieinwazyjna alternatywa dla biopsji wątroby



FibroTest i FibroMax to badania służące do nieinwazyjnej diagnostyki wątroby. Stanowią alternatywę dla biopsji wątroby. Wynik badania powstaje na podstawie wykonania badań biochemicznych, które następnie analizowane są przez specjalistyczny program komputerowy.

**FibroTest przeznaczony jest dla Pacjentów z przewlekłym WZW B i WZW C.
Służy do oceny:**

- Stopnia zwłóknienia wątroby
- Stopnia aktywności martwiczo-zapalnej o podłożu wirusowym (HCV, HBV)

FibroMax przeznaczony jest dla Pacjentów z:

- Chorobami wątroby o podłożu metabolicznym (zespoły metaboliczne: cukrzyca, hipertriglicerydemia, hipercholesterolemia, otyłość);
- Chorobami wątroby o podłożu alkoholowym
- Z przewlekłym WZW B i WZW C.

FibroMax służy do oceny:

- Stopnia zwłóknienia wątroby
- Stopnia stłuszczenia wątroby
- Stopnia aktywności martwiczo-zapalnej o podłożu wirusowym (HCV, HBV), metabolicznym i alkoholowym.

Wiarygodności wyniku

1. Wykonanie badania u pacjenta należy odroczyć w sytuacjach, które mogłyby zmodyfikować wyniki FibroTestu:

- nasilona hemoliza (atak malarii, leki powodujące hemolizę takie jak rybawiryna, azatioprina), która może wpływać na obniżenie poziomu haptoglobiny i podwyższenie poziomu niezwiązanej bilirubiny,
- ostre zapalenie wątroby w przebiegu: zakażeń wirusowych (nadkażenia HAV, HBV, HCV), chorób autoimmunizacyjnych lub wywołane lekami,
- masywna martwica wątroby, która może prowadzić do dużego wzrostu aktywności transaminaz i stężenia bilirubiny całkowitej,
- ostre zapalenia towarzyszące infekcji bakteryjnej lub wirusowej (zapalenie dróg oddechowych lub moczowych) – może powodować duży wzrost poziomu haptoglobiny
- cholestaza zewnątrzwątrobowa, np. kamienie żółciowe

2. Dla prawidłowej interpretacji wyników, przed wykonaniem badań niezbędne jest zgłoszenie:

- przewlekłej hemolizy szczególnie u pacjentów z protezą zastawki,
- Zespołu Gilberta,
- stosowania inhibitorów proteazy wykorzystywanych w terapii HIV, mogące podwyższać poziom bilirubiny niezwiązanej (Indinawir, Atazanawir) lub GGT i ALT (Ritonawir).

Jeżeli któryś z powyższych punktów dotyczy Ciebie, KONIECZNIE ZAZNACZ TO NA DRUKU ZLECENIA!

3. Interpretacja wyników nie została zwalidowana u pacjentów po przeszczepie wątroby
4. Interpretacja FibroTestu została zwalidowana dla pacjentów po przeszczepie nerki.
5. U pacjentów z upośledzeniem funkcji nerek lub dializowanych FibroTest ma dopuszczalną wartość diagnostyczną, jakkolwiek jest ona niższa niż u pacjentów po przeszczepie.

PUNKTY W KTÓRYCH MOŻESZ WYKONAĆ BADANIE DOSTĘPNE NA STRONIE www.diag.pl

miejsce na pieczętkę oddziału