

WIRUS HPV -

zagrożenie rakiem szyjki macicy

Już wiem!
Już się nie boję!



TO WAŻNE!

- Rak szyjki macicy jest rozpoznawalny u 4000 Polek rocznie!
- Zakażenie wirusem HPV jest podstawowym czynnikiem ryzyka rozwoju raka szyjki macicy!
- Co druga aktywna seksualnie kobieta ulega zakażeniu wirusem HPV!
- Sprawdź czy nie jesteś zakażona wirusem HPV!

WIRUS HPV - dowiedz się więcej!

W Polsce rak szyjki macicy jest drugim po raku piersi najczęściej diagnozowanym nowotworem u kobiet. Co roku jest on rozpoznawany u prawie 4000 Polek. Niestety połowa tych kobiet umiera z powodu zbyt późnego wykrycia nowotworu.

Najważniejszym czynnikiem chorobotwórczym odpowiedzialnym za rozwój raka szyjki macicy jest zakażenie onkogennymi typami wirusa HPV, przenoszonymi drogą płciową.

Pamiętaj!

Zakażenie wirusem HPV może przez wiele lat przebiegać bezobjawowo. Kobiety zgłaszają się do lekarza dopiero w bardzo zaawansowanym stadium rozwoju raka, kiedy jest już za późno na podjęcie skutecznego leczenia.

Nie czekaj!

Wykonaj proste i bezbolesne badane, które umożliwi wykrycie niebezpiecznych typów wirusa HPV. Jest ono doskonałym uzupełnieniem wykonywanych regularnie badań cytologicznych.

Metoda PCR - jest to wysoce czuła i swoista metoda identyfikacji mikroorganizmów - wykrywa obecność DNA wirusa a nie przeciwciał wytwarzanych przez organizm człowieka. Metoda ta gwarantuje uzyskanie jednoznacznego wyniku.

Nie ryzykuj! Zapytaj swojego lekarza jakie zagrożenie niesie zakażenie wirusem. Zapytaj również o badania diagnostyczne wykonywane najnowocześniejszymi metodami biologii molekularnej.

miejsce na pieczęć Oddziału

Uwaga:

Informacje zawarte w niniejszej ulotce mają charakter wyłącznie poglądowy oraz edukacyjny i nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji dotyczących podjęcia lub niepodjęcia leczenia lub innych procedur medycznych. Interpretacji wyników badań powinien dokonywać lekarz.



www.diag.pl

