

PAKIET BADAŃ CUKRZYCOWYCH



W PAKIETACH
OSZCZĘDZASZ
DO

15%



Zestaw badań w tym Pakiecie ma zastosowanie w rozpoznaniu i monitorowaniu przebiegu leczenia cukrzycy. Przydatny jest także w ocenie ryzyka powikłań związanych z tą chorobą, takich jak miażdżyca czy choroby nerek.

Pełnej informacji o ofercie
oraz adresów Punktów Pobrań
szukaj na www.diag.pl, www.pakiety.diag.pl

 **DIAGNOSTYKA**
laboratoria medyczne
...więcej niż wynik

NAJWIĘKSZA SIĘĆ
LABORATORIÓW
MEDYCZNYCH
W POLSCE

PAKIET BADAŃ CUKRZYCOWYCH OBEJMUJE:

- **Glukoza** – podstawowe badanie w rozpoznawaniu cukrzycy oraz monitorowaniu jej leczenia.
- **Lipidogram** – szczegółowe badanie w kierunku ryzyka rozwoju miażdżycy – przyczyny chorób układu krążenia. W skład badania wchodzi oznaczenie poziomu cholesterolu całkowitego, HDL („dobrego” cholesterolu), LDL („złego” cholesterolu) oraz triglicerydów. Badania lipidowe mają szczególne znaczenie u pacjentów z rozpoznaną cukrzycą, u których ryzyko chorób krążenia jest szczególnie wysokie.
- **HbA1c**– (hemoglobina glikowana) badanie odzwierciedlające poziom glukozy w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających badanie. Na wynik nie mają wpływu przejściowe zaburzenia glikemii, dlatego badanie to jest bardzo przydatne w ocenie leczenia cukrzycy. Badanie powinno być wykonywane co 3 miesiące u chorych na początku choroby – i co pół roku u chorych ze stabilnym przebiegiem cukrzycy.
- **Mocz**– badanie ogólne – jest podstawowym badaniem odzwierciedlającym funkcję układu moczowego służącym do wykrywania m.in. chorób nerek oraz zakażeń układu moczowo-płciowego, występujących szczególnie często w cukrzycy. Dodatkowo oceniając poziom cukru w moczu możemy wykryć cukrzycę lub wstępnie ocenić jej rozchwianie.
- **Mikroalbuminuria** – badanie pozwalające wykryć uszkodzenie nerek już na bardzo wczesnym etapie tego procesu. Powinno się je wykonywać przynajmniej raz w roku u osób z rozpoznaną cukrzycą.

Objawy mogące sugerować cukrzycę:

- częste i obfite oddawanie moczu
- wzmożone pragnienie
- nadmierne pocenie się
- utrata masy ciała
- wzmożony apetyt, napady „wilczego głodu”
- nudności
- suchość błon śluzowych i skóry
- infekcje skórne
- zapach acetonu w oddechu
- zmęczenie
- podenerwowanie
- nagłe uczucie senności
- zaburzenia widzenia
- stany zapalne narządów moczowo-płciowych, często odczuwane jako swędzenie w okolicy intymnych okolic ciała

Badania krwi w kierunku cukrzycy należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 3 lata u każdej osoby po 45. roku życia.

WARTO WIEDZIEĆ:

- Około 5% populacji choruje na cukrzycę; w tym 95% na cukrzycę typu 2-go.
- 50% chorych na cukrzycę typu 2-go nie jest świadoma swojej cukrzycy.

Pełnej informacji o ofercie oraz adresów Punktów Pobrań szukaj na www.diag.pl, www.pakiety.diag.pl

 **DIAGNOSTYKA**
laboratoria medyczne
...więcej niż wynik

NAJWIĘKSZA SIĘĆ
LABORATORIÓW
MEDYCZNYCH
W POLSCE