

PAKIET BADAŃ FUNKCJI TARCZYCY



W PAKIETACH
OSZCZĘDZASZ
DO
15%



Zestaw badań w tym Pakiecie pozwala na zaobserwowanie pierwszych sygnałów rozwoju nadczynności bądź niedoczynności tarczycy. Umożliwia on również monitorowanie przebiegu leczenia tych schorzeń. Zaburzenia funkcji tarczycy mają negatywny wpływ na wiele funkcji życiowych i objawiają się m.in. nerwowością, zmęczeniem, kołataniem serca czy nagłym przyrostem albo spadkiem masy ciała.

Pełnej informacji o ofercie oraz adresów Punktów Pobrań szukaj na www.diag.pl i www.pakiety.diag.pl

 **DIAGNOSTYKA**
laboratoria medyczne
...więcej niż wynik



PAKIET BADAŃ FUNKCJI TARCZYCY OBEJMUJE:

- **TSH** – hormon tyreotropowy; podstawowe badanie w ocenie funkcjonowania tarczycy; nieprawidłowy, wysoki poziom hormonu może sugerować niedoczynność tarczycy, a nieprawidłowo niski – jej nadczynność.
- **FT4** – tzw. wolna tyroksyna; badanie poziomu tego hormonu jest istotnym elementem oceny zaburzeń funkcjonowania tarczycy; w rozpoznawaniu chorób tarczycy istotna jest relacja pomiędzy wynikami badań FT4 i TSH.
- **anty-TPO** – najczęściej występujące autoprzeciwiactwa w chorobach tarczycy o podłożu autoimmunologicznym jak choroba Hashimoto i choroba Gravesa-Basedowa. Mogą występować zanim pojawią się zaburzenia hormonalne lub po ich wystąpieniu. U kobiet ciężarnych badanie zalecane w celu oceny ryzyka poporodowego zapalenia tarczycy.

www.diag.pl

Wskaznia do wykonania badań z Pakietu tarczycowego:

Porównanie najczęstszych objawów niedoczynności i nadczynności tarczycy.

Niedoczynność tarczycy to niedobór krążących we krwi hormonów tarczycy i obecność patologicznych skutków niedoboru tych hormonów.

Nadczynność tarczycy to nadmiar krążących we krwi hormonów tarczycy i obecność patologicznych skutków nadmiaru tych hormonów.

Najczęstsze objawy to:

zmęczenie, ciągła potrzeba snu

zwiększona wrażliwość na zimno

suche i łamliwe włosy; wypadanie włosów, łuszczące i rozdławające się paznokcie; sucha, zimna skóra

zaburzenia miesiączkowania: przedłużone i obfite menstruacje

niewytłumaczalny przyrost masy ciała

depresja

kłopoty z koncentracją
obniżone ciśnienie krwi,
„słabe” tętno

obrzymiała twarz
i worki pod oczami

uczucie kłucia w palcach
i dłoniach

Najczęstsze objawy to:

zaburzenia snu

uczucie gorąca,
zwiększona potliwość

wypadanie włosów;
łamliwe paznokcie

zaburzenia miesiączkowania:
rzadko występujące menstruacje
bądź ich brak

niewytłumaczalna utrata masy ciała

nerwowość, stany lękowe
nadaktywność

(szczególnie widoczna u dzieci)

kołatanie serca
opuchlizna w przedniej
części szyi

wytrzeszcz oczu
lub kłopoty ze wzrokiem

Pełnej informacji o ofercie
oraz adresów Punktów Pobrań
szukaj na www.diag.pl i www.pakiety.diag.pl

 **DIAGNOSTYKA**
laboratoria medyczne
...więcej niż wynik

