



Diagnostyka endometriozy wspomagana badaniem krwi

EndomKIT

miejsce na pieczęć oddziału

Uwaga:

Informacje zawarte w niniejszej ulotce mają charakter wyłącznie poglądowy oraz edukacyjny i nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji dotyczących podjęcia lub niepodjęcia leczenia lub innych procedur medycznych. Interpretacji wyników badań powinien dokonywać lekarz.



Dowiedz się więcej.
Wejdź na diagnostyka.pl
lub pobierz aplikację Dia.

Diagnostyka+

Bóle w obrębie
miednicy?

Bolesne
miesiączki?

Niepłodność?

Przyczyną może być **endometrioza** – przewlekła, wyniszczająca choroba, polegająca na występowaniu tkanek podobnych do endometrium poza jamą macicy.

Endometriozie mogą też towarzyszyć objawy takie jak:

- + bóle owulacyjne
- + bóle podczas defekacji, oddawania moczu, współżycia
- + bóle odczuwane jako bóle stawów i pleców
- + niestrawność, zaparcia, biegunki
- + osłabienie, przewlekłe zmęczenie

Czy wiesz, że:

5-10% kobiet

w wieku rozrodczym może mieć endometriozę

nawet 65% kobiet

jest początkowo błędnie zdiagnozowana

4-11 lat

to średni czas potwierdzenia rozpoznania endometriozy



Badanie krwi może pomóc lekarzowi w potwierdzeniu/wykluczeniu endometriozy

Dla kogo jest badanie?

- + dla kobiet, u których lekarz podejrzewa endometriozę (objawy, badanie ginekologiczne, badania obrazowe – np. USG)
- + dla kobiet, u których badania inwazyjne w kierunku endometriozy (laparoscopia z badaniem histopatologicznym) nie są wskazane

Badanie nie jest przeznaczone dla kobiet w ciąży

Na czym polega badanie?

1. Wypełniasz formularz z danymi klinicznymi ze swoim lekarzem ginekologiem.
2. Z wypełnionym formularzem zgłaszasz się do jednego z wyznaczonych punktów Diagnostyki na pobranie krwi.
3. W laboratorium w Twojej krwi oznaczane są stężenia dwóch markerów związanych z rozwojem endometriozy – CA125 i BDNF
4. Wyniki badań oraz przekazane dane są wprowadzane do medycznego algorytmu, który generuje raport diagnostyczny.
5. Raport i wyniki z biomarkerów stanowią komplet wyników, które interpretuje lekarz.



sprawdź listę
na stronie

Raport diagnostyczny

- wynik pozytywny – wskazuje na potwierdzenie endometriozy
- wynik negatywny – nie wskazuje na endometriozę, ale jej nie wyklucza



Każdy wynik wymaga interpretacji przez lekarza, ponieważ tylko lekarz może prawidłowo zinterpretować wyniki i podjąć dalsze decyzje kliniczne.

Przygotowanie do badania



Jeśli to możliwe, terapia hormonalna powinna być wstrzymana na 3 miesiące przed wykonaniem badania.



Na pobranie krwi zgłoś się na czczo (co najmniej 10 godzin od ostatniego posiłku).

Nowość w ofercie

Kod	Nazwa badania
5514	Endometrioza – EndomKIT

