

Małoinwazyjne badania w diagnostyce endometriozy

Małoinwazyjne badania (niewymagające zabiegu laparoskopowego oraz pobytu w szpitalu) służące zdiagnozowaniu endometriozy pozwalają przede wszystkim na skrócenie czasu do postawienia rozpoznania.

+ Endometrioza EndoRNA (kod 5483)

W badaniu pobranego fragmentu endometrium oznacza się poziom ekspresji markera, czyli genu kodującego białko fukozylotransferazę 4 (FUT4). Ekspresja genu (mRNA) FUT4 jest znacząco podwyższona w komórkach endometrium pacjentek z endometriozą w porównaniu do endometrium pacjentek zdrowych.

+ Endometrioza - EndomKIT (kod 5514)

Badanie EndomKIT poza oznaczeniem we krwi stężenia markera CA125 i mózgowego czynnika neurotroficznego, neutrofiny, BDNF (ang. Brain-Derived Neurotrophic Factor), wymaga dokładnego wywiadu klinicznego z pacjentką, który obejmuje np. ocenę dotychczasowych wyników badań oraz uzyskania odpowiedzi na temat doskwierających jej dolegliwości.



Zasadność wykonania badań w kierunku endometriozy powinno się omówić z lekarzem ginekologiem.



Nowe możliwości w diagnostyce endometriozy

Testy:

- + Endometrioza EndoRNA
- + Endometrioza EndomKIT

miejsce na pieczętkę oddziału

Uwaga:

Informacje zawarte w niniejszej ulotce mają charakter wyłącznie poglądowy oraz edukacyjny i nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji dotyczących podjęcia lub niepodjęcia leczenia lub innych procedur medycznych. Interpretacji wyników badań powinien dokonywać lekarz.



Dowiedz się więcej.
Wejdź na diagnostyka.pl


Diagnostyka+

Endometrioza – co to za choroba?

W endometriozie wyściółka macicy, czyli endometrium z różnych przyczyn pojawia się w innych miejscach ciała i podlega zmianom hormonalnym cyklu miesięcznego. Oznacza to, że endometrium poza macicą okresowo zmienia swoją grubość, a uciskając na sąsiadujące tkanki powoduje rozwój stanu zapalnego, który objawia się m.in. bólem.

Objawy związane z endometriozą

- + Bolesne miesiączkowanie przebiegające z nasilonymi skurczami oraz promieniowaniem bólu, drętwieniem nóg
- + Ból podczas stosunku, ból podczas owulacji
- + Nasilone krwawienia, nieregularne występowanie krwawień miesięcznych
- + Nasilone dolegliwości zespołu napięcia przedmiesiączkowego (PMS)
- + Dysfunkcje układu moczowego (ból przy sikaniu, krew w moczu)
- + Dysfunkcje dolnego odcinka przewodu pokarmowego (wzdęcia, biegunki, zaparcia)
- + Zmęczenie, brak energii, stany depresyjne
- + Niepłodność



Endometrioza – kogo dotyczy?

Endometrioza najczęściej dotyczy kobiet w wieku rozrodczym (25-35 lat), rzadziej diagnozowana jest u dziewcząt i kobiet po menopauzie.

Jak się diagnozuje?

Wstępnie endometrioza rozpoznawana jest na podstawie charakterystycznych objawów występujących u pacjentki, także na podstawie dodatkowych badań obrazowych, np. USG. Niekiedy diagnoza wymaga pobrania zmienionych chorobowo tkanek podczas inwazyjnego zabiegu laparoskopowego i ich oceny pod mikroskopem. Rozwój medycyny i diagnostyki laboratoryjnej daje także możliwość wykonania nieinwazyjnych badań wspomagających diagnostykę endometriozy.

Porównanie małoinwazyjnych badań w kierunku endometriozy

Endometrioza EndoRNA
(kod 5483)

Endometrioza EndomKIT
(kod 5514)

Wymagana konsultacja z lekarzem ginekologiem

TAK – dlaczego?
Ze względu na konieczność pobrania materiału przez lekarza ginekologa.

TAK – dlaczego?
Ze względu na konieczność przeprowadzenia szczegółowego wywiadu z pacjentką.

Pobranie materiału

Fragment endometrium z jamy macicy pobiera lekarz ginekolog za pomocą specjalnego, dedykowanego badaniu zestawu.

Pobranie krwi odbywa się w wyznaczonych Punktach Pobrań sieci laboratoriów Diagnostyka (listę punktów sprawdzisz skanując kod QR umieszczony poniżej)

Pobranie materiału a stosowanie leków

W każdym przypadku zalecane jest odstawienie leków wpływających na endometrium (hormonoterapii) przynajmniej na okres 3 miesięcy przed pobraniem.

W którym dniu cyklu wykonać badanie?

Druga, tzw. wydzielnicza faza cyklu (dni występujące po owulacji)

Dzień cyklu nie ma znaczenia

Czy muszę być na czczo?

Nie

Tak

Kto nie może wykonać badania?

Kobiety w ciąży



Kobiety w ciąży

Test został opracowany dla kobiet w wieku 18 – 50 lat.



sprawdź listę wyznaczonych Punktów Pobrań, w których możesz wykonać badanie Endometrioza – EndomKIT

