

Co może mieć wpływ na wynik:

- + Od osób suplementujących biotynę w dawce >5mg/dobę, materiał do badania należy pobierać najwcześniej po 8 godz. od ostatniego zażycia biotyny.
- + W przypadku badań serologicznych pojawia się tzw. okienko serologiczne, czyli okres, w którym mimo toczącego się zakażenia wyniki wymienionych badań nie będą jeszcze potwierdzały infekcji. W związku z powyższym opisany test na choroby weneryczne najlepiej wykonać nie wcześniej niż 6-8 tygodni od potencjalnego zakażenia.

e-Pakiet intymny jest wskazany:

- + W diagnostyce najbardziej rozpowszechnionych chorób przenoszonych drogą płciową: wirusowego zapalenia wątroby typu B i C (WZW B i C), zakażenia wirusem HIV, kiły, opryszczki jamy ustnej i narządów płciowych, chłamydiozy
- + Profilaktycznie, do wykluczenia lub potwierdzenia ewentualnego bezobjawowego zakażenia wirusami lub bakteriami przenoszonymi drogą płciową

Przygotowanie do badania:



Na badania z pakietu badań intymnych możesz zgłosić się o każdej porze dnia



Nie musisz być na czczo

e-Pakiet intymny

8 badań

Badanie dostępne na diag.pl lub po zeskanowaniu kodu QR.



Dowiedz się więcej.
Wejdź na diagnostyka.pl

Pakiet badań intymny

8 badań

% w pakiecie taniej



Diagnostyka+

Choroby przenoszone drogą płciową – czyli jakie?

Choroby przenoszone drogą płciową charakteryzują się często długim okresem bezobjawowym. Mimo braku zauważalnych objawów, prowadzą do postępujących zaburzeń w organizmie, które mogą skutkować niewydolnością i marskością wątroby (WZW B i C), poważnym upośledzeniem odporności organizmu (HIV), uszkodzeniem układu nerwowego (kiła) oraz niepłodnością (chłamydioza).

Jakie badania na choroby weneryczne?

e-Pakiet intymny uwzględnia badania intymne, serologiczne (poziom przeciwciał skierowanych przeciwko drobnoustrojom) wykonywane z próbki krwi: HBs antygen, HCV przeciwciała, HIV Ag/Ab (Combo), Kiła (Treponema pallidum), Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgG, Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgM, Chłamydia trachomatis IgG, Chłamydia trachomatis IgM.

Choroby przenoszone drogą płciową często kojarzą się z objawami, wśród których wymienia się nieprawidłowe wydzieliny z układu moczowo-płciowego, świąd i pieczenie, czy też zmiany skórne w okolicach intymnych. O ile objawy te inicjują wizytę w gabinecie lekarza, to również możliwy bezobjawowy przebieg zakażenia, a w związku z tym brak wdrożonej farmakoterapii mogą być przyczyną poważnych konsekwencji zdrowotnych i doskwierających powikłań. Zatem jakie badania na choroby weneryczne wykonać?

Poznaj znaczenie badań uwzględnionych w e-Pakiecie intymnym:

HBs antygen i HCV przeciwciała

HBs antygen i HCV przeciwciała to badania służące wykryciu zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C. HBs antygen stanowi podstawowy marker zakażenia wirusem HBV, odpowiedzialnym za rozwój WZW B; natomiast przeciwciała swoiste dla antygenów HCV w klasie IgM i IgG pozwalają na stwierdzenie zakażenia wirusem HCV, odpowiedzialnym za rozwój WZW C. Jedną z dróg zakażenia WZW B i C są kontakty seksualne, stąd diagnostykę chorób uwzględniono e-pakiecie intymnym. Przebieg chorób bardzo często jest długotrwale bezobjawowy, natomiast w konsekwencji trwania zakażenia i braku leczenia dochodzi do rozwoju niewydolności wątroby, marskości, a nawet procesu nowotworowego w obrębie narządu.

HIV Ag/Ab (Combo)

HIV Ag/Ab (Combo) jest badaniem wykonywanym w diagnostyce zakażenia wirusem HIV. Zakażenie wirusem HIV jest długotrwale bezobjawowe. Wirus atakuje komórki układu odpornościowego, co po wielu latach od zakażenia prowadzi do całkowitego upośledzenia jego działania i rozwinięcia AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności). Upośledzenie odporności wiąże się z występowaniem zagrażających życiu infekcji, które wywołane są drobnoustrojem niegroźnym dla osób zdrowych. Charakterystyczne dla AIDS jest również duże ryzyko zachorowania na nowotwory, np. chłoniaki.

Kiła (Treponema pallidum)

Kiła (Treponema pallidum) jest badaniem służącym diagnostyce bakteryjnej choroby zakaźnej – kiły, przenoszonej drogą płciową. Choroba może mieć długofalowy przebieg z następującymi po sobie okresami bezobjawowymi i przebiegającymi z nasileniem objawów (np. zmiany wrzodowe w okolicach intymnych, wysypka na tułowie, zaburzenia w układzie sercowo – naczyniowym i nerwowym). Diagnostyka choroby jest szczególnie istotna dla kobiet planujących ciążę i w ciąży, ponieważ zakażenie okołoporodowe noworodka wiąże się z niebezpiecznym dla zdrowia i życia wielonarządowym, przewlekłym procesem zapalnym.

Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgM i Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgG

Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgM i Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgG to badania wykonywane w diagnostyce zakażenia wirusem opryszczki – Herpes simplex typu 1 i 2. Oba typy wirusów opryszczki są przenoszone drogą płciową, mogą atakować śluzówki narządów płciowych powodując uciążliwe objawy doraźnie (pęcherze oraz owrzodzenia narządów płciowych lub odbytu, upławy i bolesność w trakcie oddawania moczu) i konsekwencje w przyszłości (groźna dla życia i zdrowia noworodka transmisja okołoporodowa).

Chłamydia trachomatis IgM i Chłamydia trachomatis IgG

Chłamydia trachomatis IgM i Chłamydia trachomatis IgG to badania służące wykryciu chłamydiozy. Bakteria – Chłamydia trachomatis jest najczęstszym patogenem przenoszonym drogą płciową, wymagającym szczególnej uwagi, gdyż 70% zakażeń przebiega bezobjawowo lub z objawami łagodnymi, natomiast powikłania zakażenia mogą być bardzo poważne. Zakażenie Chłamydją trachomatis może utrudniać zajście w ciążę lub być przyczyną niepłodności zarówno kobiety jak i mężczyzny.

Ze względu na szereg zależności występujących między analizowanymi parametrami wyniki uzyskanych badań należy skonsultować z lekarzem

