

Najszybciej w aplikacji

Odbierz swoje wyniki w aplikacji

Zeskanuj kod QR, pobierz aplikację
i miej swoje wyniki zawsze pod ręką



Zeskanuj i pobierz



📱 Wyniki
w telefonie

📄 Historia badań
w jednym miejscu

🔔 Powiadomienia
o gotowych wynikach

Uwaga:

Informacje zawarte w niniejszej ulotce mają charakter wyłącznie poglądowy oraz edukacyjny i nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji dotyczących podjęcia lub niepodjęcia leczenia lub innych procedur medycznych. Interpretacji wyników badań powinien dokonywać lekarz.

wersja 1/2026



Dowiedz się więcej.
Wejdź na www.diag.pl



Proclarix®

ocena ryzyka klinicznie
istotnego raka prostaty

Diagnostyka+

Proclarix®

Nieinwazyjne badanie wykonywane z próbki krwi, wspierające lekarza w podjęciu decyzji, czy biopsja prostaty jest rzeczywiście uzasadniona.

Proclarix® – co to za badanie?

Badanie Proclarix® ocenia indywidualne ryzyko występowania klinicznie istotnego raka gruczołu krokowego, czyli takiego, który może wymagać dalszej diagnostyki lub leczenia.

- + Test opiera się na oznaczeniu dwóch białek: trombospondyny 1 (THBS1) oraz katepsyny D (CTSD).
- + Uzyskane wyniki są analizowane razem z wiekiem oraz stężeniem PSA całkowitego i PSA wolnego.
- + Na tej podstawie wyliczany jest Proclarix Risk Score, czyli wynik określający ryzyko obecności klinicznie istotnego raka prostaty.

Kiedy wykonuje się badanie Proclarix®?

- + Gdy celem diagnostyki jest ograniczenie ryzyka wykonania niepotrzebnej biopsji prostaty.
- + Gdy dotychczasowe wyniki badań są graniczne lub niejednoznaczne i wymagają pogłębionej oceny przez lekarza.
- + Gdy stężenie PSA całkowitego mieści się w zakresie 2,0–10,0 ng/ml.
- + Gdy wynik rezonansu magnetycznego prostaty jest niejednoznaczny, np. PI-RADS 3.

Korzyści z wykonania badania Proclarix®

- + Wynik wspiera lekarza w ocenie, czy biopsja prostaty jest rzeczywiście uzasadniona.
- + Pomaga doprecyzować indywidualne ryzyko klinicznie istotnego raka prostaty.
- + Wspiera ocenę ryzyka raka prostaty u mężczyzn z niejednoznacznym wynikiem rezonansu magnetycznego prostaty, np. PI-RADS 3.
- + Badanie wymaga jedynie pobrania próbki krwi.

Pamiętaj przed badaniem



Do punktu pobrania możesz zgłosić się o każdej porze dnia, nie musisz być na czczo.



W cenie badania uwzględniono oznaczenie PSA całkowitego i PSA wolnego – nie musisz wykonywać tych badań osobno.




Jazda na rowerze lub stosunek seksualny mogą wpływać na stężenie uwzględnionego w badaniu PSA. W takich sytuacjach zaleca się odczekać 1–2 dni przed pobraniem krwi.



Po badaniu palpacyjnym prostaty per rectum termin wykonania badania należy ustalić zgodnie z zaleceniem lekarza.

Skala ryzyka raka prostaty o wysokim stopniu złośliwości

Znajomość ryzyka istotnego klinicznie raka prostaty w skali Proclarix® optymalizuje wybór kolejnych etapów diagnostyki i terapii nowotworu prostaty.



Wynik badania Proclarix® powinien być zawsze interpretowany przez lekarza łącznie z innymi informacjami klinicznymi, w tym ze stężeniem PSA, wskaźnikiem fPSA/PSA, wynikami badania prostaty, rezonansem magnetycznym, objawami, wiekiem pacjenta oraz obciążeniem rodzinnym. Nie podejmuj decyzji o wykonaniu biopsji ani o rezygnacji z niej wyłącznie na podstawie wyniku Proclarix®. O dalszym postępowaniu diagnostycznym powinien zdecydować lekarz.